

プロトコール名 ペトレキセド／シスプラチン併用療法

- 進行・再発癌 術後補助化学療法 術前補助化学療法
 大量化学療法 局所療法 その他()

投与順	抗癌剤名(商品名・略号)	1日投与量	投与法	投与時間	投与日(d1, d8等)
1	シスプラチン(シスプラメルク・CDDP)	75mg/m ²	div	2時間	d1
2	ペトレキセド(アリムタ)	500mg/m ²	div	10分	d1
3					

1コース期間 (次コースまでの標準期間)	3週間(1投2休)
総コース数	6回
コース間での休薬の規定	白血球<2000/mm ³ 、好中球<1000/mm ³ 、血小板<5万/mm ³

減量規定・中止基準	4日以上続く※Grade4の好中球減少 ※Grade4の血小板減少 PD
投与量の増量規定	なし
投与期間の短縮規定	なし
コースによる変化	なし
1日の中での抗癌剤投与順	ペトレキセド→シスプラチン
プレメディケーション・ポストメディケーション	<併用薬>アリムタ投与7日以上前から、1日1回、葉酸0.5mgを連日経口投与。アリムタ投与7日以上前から9週間毎にビタミンB12を1mg筋肉注射。 <プレメディケーション>グラニセトロンバック+デカドロン8mg

患者条件(初回条件)

※CTCAE v3.0

- ・PS 0~2
- ・主要臓器機能に大きな異常がない

除外規定

- ・PS 3以上
- ・本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者
- ・重篤な骨髄抑制のある患者
- ・妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

実施上の注意点

慎重投与

- ・骨髄抑制のある患者
- ・間質性肺炎、肺繊維症、又はこれらの疾患の既往歴のある患者
- ・胸水又は腹水が認められる患者
- ・腎障害のある患者
- ・肝障害のある患者
- ・高齢者

その他(特記事項)

併用薬

- ①葉酸:アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与。なおアリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与。
- ②ビタミンB12:アリムタ初回投与の7日以上前からビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与。